

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 10-7-69 553560

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 36-01-74)

ABONNEMENT ANNUEL

(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MORBIHAN, ORNE)

25 F

Sous-Régisseur de Recettes de la D.D.A. — Protection des Végétaux. Route de Fougères, RENNES

C. C. P. RENNES 9404-84

Bulletin n° 106

9 Juillet 1969

AVERTISSEMENTS

TOMATE

MILDIOU - Les conditions climatiques devenant très favorables à la maladie, des taches sur feuilles risquent d'apparaître dans les jours qui viennent. Il est donc nécessaire de protéger cette culture par un traitement qui devra être appliqué, dans la mesure du possible, dès cette semaine.

POMME DE TERRE

MILDIOU - La tempête du 6 Juillet ainsi que les pluies des 7 et 8 ont en partie lessivé le dernier traitement. Par ailleurs elles ont favorisé la formation de nouveaux germes responsables de nouvelles contaminations.

Dans cette situation, les mesures à prendre sont les suivantes :

1°) Cultures ayant atteint un stade de tubérisation satisfaisant -

- Si les fanes sont en grande partie détruites par le mildiou : réaliser le défanage dans les meilleurs délais.

- S'il existe plusieurs foyers dispersés dans toute la parcelle : effectuer le défanage car un petit nombre de taches superficielles est suffisant pour entraîner une attaque grave sur tubercules.

- Dans les cultures indemnes : réaliser dès que possible un traitement.

2°) Cultures dont la tubérisation est insuffisante -

- Si le feuillage est en partie détruit, la récolte risque d'être très compromise quelle que soit la solution envisagée, défanage ou traitement anti-mildiou.

P.1286

- Si la culture est peu attaquée ou indemne, réaliser un nouveau traitement dès la fin de la semaine.

INFORMATIONS

POMMIER - POIRIER

CARPOCAPSE - Les dernières précipitations ainsi que les baisses notables de température ont considérablement ralenti l'activité de ce parasite. Le deuxième traitement, conseillé pour le 4 Juillet, garde encore une partie de son efficacité. Toutefois il sera bon de le renouveler vers le 17 Juillet pour assurer une protection efficace jusqu'à la fin de la première génération.

TAVELURE - Si le mauvais temps persiste, prévoir l'adjonction d'un produit anti-tavelure à la bouillie insecticide destinée à lutter contre le carpocapse. Dans ce cas avancer le traitement mixte de 1 à 2 jours.

L'Ingénieur d'Agronomie,

A. CRESPIY,

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,

J. DELOUSTAL.